

## Systematisches Verzeichniss der Vögel Afrika's.

Von

Baron Dr. J. W. v. Müller.

(Schluss von Jahrg. III, S. 449—464.)

743. *Plocepasser melanorhynchus* Rüpp.

*Ploc. mahali* var. Sm. Ill. South. Afr. Zool. Av. t. 65. — Bonap. Consp. p. 444. — *Philagrus superciliosus* Cab.  
Abyssinien.

744. *Nigrita canicapilla* Strickl.

*Aethiops canicapillus* Proc. Zool. Soc. 1841. p. 30. — Fras. Zool. typ. IX. t. 2. — Rev. et Mag. de Zool. 1851. p. 420. — Bonap. Consp. 444. — Hartl. Synops. sp. 309.  
Fernando Po, Gaboon.

745. *Nigrita fusconota* Fras.

Proc. Zool. Soc. 1842. p. 145. — Allen Exp. Nig. II. p. 501. — Fras. Zool. typ. VIII. pl. 2. — Bp. Consp. p. 444. — Hartl. Synops. W. Afr. sp. 310.  
Fernando Po.

746. ? *Nigrita Arnaudi* Puch.

Bonap. Consp. p. 444.  
Vom weissen Nil.

747. *Nigrita bicolor* Sclat.

*Pytelia bicolor* Hartl. Verz. d. Brem. Samml. p. 76. — Sclat. in Jard. Contrib. 1852. p. 2 et 4. — Hartl. Synops. sp. 311.

748. *Nigrita luteifrons* Verr.

Rev. et Mag. de Zool. 1851. p. 420. — Hartl. Synops. sp. 312.  
Gaboon.

749. *Sporopipes frontalis* Cab.

*Fring. frontalis* Vieill. Encyclop. p. 990. — Vieill. Ois. chant. t. 16. — Bonap. Consp. p. 444. — Hartl. Synops. sp. 313.  
In Abyssinien u. Sennaar, häufig in Kordofan u. Darfur. Am Senegal.

750. *Sporopipes lepidopterus* Cab.

*Fring. lepidoptera* Licht. — *Amadina squamifrons* Smith. — *Estrelida squamifrons* Gr. — *Ploc. lepidopterus* Gr. — Sm. Illust. S. Afr. Zool. Av. t. 95. f. . . . — Bonap. Consp. p. 444.  
Süd-Afrika.

751. *Philetaerus socius* Strickl.

*Loxia socia* Lath. — *Ploc. Patersoni* Less. — *Euplectes lepidus* Sws. — *Philet. lepidus* Sm. — Paters. Voy. t. 19. — Ill. S. Afr. Zool. Av. t. 8. m.

## Süd-Afrika.

752. *Quelea* (Reichb.) *sanguirostris* (Lin.)

*Loxia sanguirostris* Lin. — *Ember. quelea* L. — *Passer senegalensis erythrorhynchos* Briss. — *Fring. quelea* Licht. — *Loxia Lathamii* Sm. — Pl. enl. 223. 1. (?) — Edw Birds t. 271. 2. — *Ember. quelea* Lin. S. N. X. p. 177. — Bp. Consp. p. 445.

In Abyssinien zuweilen in Schaaren von mehreren Tausenden. In Sennaar; in Kordofan ziemlich selten. Ob der südafrikanische Vogel hierher oder zur folgenden Species gehört, ist mir unbekannt.

753. *Quelea occidentalis* Hartl.

Vieill. Ois. chant. t. 22—24. — *Passer senegal. erythrorhynch.* Briss. Orn. III t. 6. fig. 1. — Pl. enl. 183. 2. — Sws. Birds W. Afr. I. p. 188. — Sundev. Oefvers. 1850. p. 126. — Hartl. Synops. sp. 314.

In Senegambien.

(Nach den Vögeln aus West- und Ost-Afrika zu urtheilen, welche ich zu sehen Gelegenheit hatte, scheint diess eine selbstständige Species zu sein.)

454. *Foudia* (Reichenb.) *madagascariensis* (L.)

*Euplectes rubra* Sws. — *Cardinalis madagascariensis* Briss. — *Ploc. madagascariensis et ruber* Gr. — Pl. enl. 134. 2. — Vieill. Ois. chant. t. 63.

St. Maurice und Madagascar.

755. *Foudia Martineti* Gr.

*Fringilla erythrocephala* Gm. — *Emberiza rubra* Gm. — *Ploc. erythrocephalus* Sws. — *Hyphantornis erythrocephala* Blyth. — Pl. enl. 665. 1 et 2. — Brown Ill. Zool. t. 28. 2. — Vieill. Ois. chant. t. 28.

St. Maurice.

Der Speciesname *erythrocephalus* würde leicht Veranlassung zur Verwechslung mit *Ploc. erythrocephalus* Rüpp. geben, wesshalb der von Gray gegebene Name *Martineti* dieser Species füglich bleiben kann.

756. *Foudia erythropros* Hartl.

*Ploceus erythropros* Hartl. Rev. Zool. 1848. p. 109. — Bonap. Consp. p. 446. — Hartl. Beitr. zur Orn. W.A. t. 8 — Id. Syn. sp. 315.

Insel St. Thomä.

757. *Foudia emincntissimus* Bonap.

Consp. p. 446.

Nach Bonaparte von Ost-Afrika, Zanzibar.

758. *Euplectes nigriventris* Cass.

Proc. Acad. Philad. 1848. p. 66. — Journ. Acad. Philad. 1849. 1. t. 31. 1. — Bonap. Consp. p. 447.

Zanzibar.

759. *Euplectes ignicolor* Sws. — *Loxia ignicolor* Vieill. — *Fr. ignicolor* Licht. — *Loxia franciscana* Isert. — *Ploc. franciscanus* Gr. — Pl. enl. 134. — Vieill. Ois. chant. t. 59. — Isert Schrift. Berl. naturf. Fr. IX. 332. t. 9. — Ehrenb. Symb. Phys. Av. t. 2. — Licht. Doubl. Cat. p. 24. — Sws. Birds W. Afr. I. p. 104. — Gordon, Jard. Contrib. 1849. p. 9. — Bonap. Consp. p. 446. — Hartl. Synops. sp. 317.

Am häufigsten in Nubien; sonst in Sennaar, Abyssinien, Senegambien u. s. w.

760. *Euplectes oryx* Sm.

*Loxia oryx* L. — *Fring. carolinensis* Gm. — *Fring. oryx* Licht. — *Cardinalis capitis bonae spei* Briss. — Pl. enl. 6. 2. et 309. 2 et 181. 2. — Vieill. Ois. chant. t. 66. — Sws. Birds W. Afr. I. p. 187. — Bp. Consp. p. 446. — Hartl. Syn. sp. 318.

Süd- und West-Afrika.

761. *Euplectes flammiceps* Sws.

*Ploceus flammiceps* Gr. — Sws. Birds W. Afr. I. t. 13. — Gordon, Jard. Contrib. 1849. p. 9. — Bonap. Consp. p. 446. — Rüpp. Wirbelth. p. 101. — Hartl. Synops. sp. 346.

Senegal und Abyssinien.

762. ? *Euplectes Sunderalli* Bonap.

*Ploc. oryx* var. minor Sundev. Mus. Holm. — Bp. Consp. p. 446. Kafferland.

763. *Euplectes Petiti* O. des Murs.

Lefeb. Voy. Abyss. Atl. Ois. t. 10. — Bonap. Consp. p. 446 Abyssinien.

764. *Euplectes craspedopterus* Schiff.

Bonap. Consp. p. 446.

Abyssinien. (Mir unbekannt.)

765. *Euplectes melanogaster* Sws.

*Loxia melanogastra* Lath. — *L. afra* Gm. — *Fring. abyssinica* Vieill. — *Fring. ranunculacea* Licht. — Brown Illustr. t. 24. 2. — Lath. Ind. Orn. I. 395. — Vieill. Ois. chant. t. 28. — Id. Encyclop. p. 953. — Licht. Doubl. p. 23. — Sws. Birds W. Afr. I. p. 182. — Bonap. Consp. p. 447. — Hartl. Synops. sp. 319.

Vom Senegal und Niger.

766. *Euplectes xanthomelas* Rüpp.

Verz. N. O. Afr. t. 28. — Bonap. Consp. p. 447.

Abyssinien, Sennaar.

767. *Euplectes approximans* Cab.

*Orynx approximans* Cab. Mus. Hein. I, p. 177. no. 868.  
Süd-Afrika.

768. *Euplectes capensis* Sm.

*Loxia capensis* L. — *Icterus flavescens* Daud. — *Fring. phalerata* Ill. Licht. — Pl. enl. 101. m. 659. 1. fem. — Bp. Consp. p. 447.  
Süd-Afrika.

769. *Euplectes aurinotus* Sws.

*Loxia aurea* Lath. — *Coccothraustes aurea* Vieill. — Brown Ill. t. 25. 1. — Lath. Ind. Orn. I. 373. — Vieill. Enc. p. 1003.  
— Hartl. Synops. sp. 321.  
Benguela.

770. *Euplectes taha* Sm.

*Ploc. taha* Gm. — *Pl. dubius* Sm. — *Pl. melanocephalus* Vieill. — Sm. Ill. S. Afr. Zool. Av. t. 7. — Bonap. Consp. p. 447.  
Süd-Afrika.

771. *Euplectes jonquillaceus* (Vieill.)

*Ploc. tricolor* Hartl. Mus. Lugd. — Id. Beitr. z. Orn. W. Afr. p. 46. — Vieill. N. Dict. d'hist. nat. 34. p. 130. — Guér. Iconogr. Ois. t. 18. 8. — Hartl. Synops. sp. 320.  
Angola.

2. Subfam. VIDUINAE.

772. *Urobrachya* (Bp.) *axillaris* (Sm.)

Ill. S. Afr. Zool. Av. t. 17. m. — Bonap. Consp. p. 447.  
Süd- und Ost?-Afrika.

773. *Urobrachya albonotata* (Cassin.)

*Vidua albonotata* Cass. Proceed. Acad. Nat. sc. Philad. 1848. p. 66. — Journ. Ac. Nat. sc. Philad. I. t. 30. — Bonap. Consp. p. 448. — Hartl. Synops. sp. 322.  
West-Afrika?

774. *Penthetria macroura* Cab.

*Loxia macroura* Gm. — *Loxia longicauda* Lath. — *Fring. flavoptera* Vieill. — *Fring. chrysoptera* Id. — *Vidua chrysonota* Sws. — Pl. enl. 183. 1. — Lath. Ind. Orn. 373. — Vieill. Ois. chant. t. 41. — Id. Enc. p. 964. — Sws. Birds W. Afr. I. p. 178. — Bonap. Consp. p. 448. — Hartl. Synops. sp. 323.  
Ganz West-Afrika.

775. *Penthetria laticauda* Cab.

*Fring. laticauda* Licht. — *Coliuspasser torquatus* Rüpp. —

*Vidua laticauda* Gr. — Rüpp. Atl. 36. 2. — Bonap. Consp. p. 448.  
Abyssinien, Sennaar, nicht selten am weissen Nil.

776. *Penthetria rubritorques* (Sws.)

*Ember. panayensis* Gm. — *Ember. signata* Scop. — *Fring. auricollis* Licht. — *Vidua torquata* Less. — *Vidua lenocinia* Id. — *Vidua ardens* Gr. ex Bodd. — *Penthetria ardens* Cab. Mus. Hein. I, p. 177. — Pl. enl. 647. — Sonn. Voy. t. 75. (v. 76?) — Sws. W. Afr. I. p. 174. — Less. Tr. p. 437. — Id. Compl. VIII. 278. — Bonap. Consp. p. 448. — Hartl. Synops. sp. 324.  
In Ost-, West- und Süd-Afrika.

777. *Penthetria concolor* (Cass.)

*Vidua concolor* Cass. — *Coliostruthus concolor* Sundeval Oefvers. V. Ac. Förh. 1849. p. 158. — Cass. Proc. Ac. N. Sc. of Philad. 1848. p. 66 et Journ. 1849. I. t. 30. 1. — Bonap. Consp. p. 448. — Hartl. Synops. sp. 325.

Sierra Leone, Port Natal.

778. *Penthetria flaviscapulatus* (Rüpp.)

*Coliuspasser macrurus* Rüpp. — *Fring. macrocerca* Licht. — *Vidua macroc.* Gr. — *Penth. macrocerca* Cab. — Brown. Ill. t. 11.  
Abyssinien, Sennaar, Bacher el abiad.

779. *Chera progné* Gr.

*Loxia caffra* Gm. — *Ember. longicauda* Gm. — *Vidua phoenicoptera* Sws. — Pl. enl. 635. — Mill. Icon. t. 111. — Vieill. Ois chant. t. 39. 40.

Süd-Afrika.

780. *Steganura* (Rehb.) *paradisea* Cab.

*Emberiza paradisea* L. — *Fring. paradisea* Licht. — *Vidua paradisea* Cuv. — *Vidua africana* Briss. — Pl. enl. 194. — Edw. Birds t. 86. — Vieill. Ois. chant. t. 37. 38. — Sws. Birds W. Afr. I. t. 11. — Bp. Consp. p. 449. — Hartl. Syn. sp. 326.  
Angola, Sierra Leone, Abyssinien, Sennaar, Kordofan.

781. ? *Steganura sphenura* Cab.

Mus. Hein. I. p. 176. — *Vidua sphenura* Verr. — *Steganura Verreauxi* Bonap. Consp. p. 449.

Soll die ostafrikanische *paradisea* sein.

782. *Vidua* (Cuv.) *regia* (L.)

*Emberiza paradisca* L. — *Vidua riparia africana* Briss. — *Fring. regia* Licht. — Pl. enl. 8. 1. — Vieill. Ois. chant. 34. 35. — Briss. Orn. III. p. 129. — Bonap. Consp. p. 449. — Hartl. Synops. sp. 327.

In Nubien, Sennaar, am weissen Nil. Nach Bonaparte am Senegal?

783. *Vidua superciliosa* (Vieill.)

Gal. Ois. t. 61. — Bonap. Consp. p. 449.

Süd-Afrika.

784. *Vidua serena* (Lin.)

*Emberiza serena* L. — *Emb. vidua* L. — *Emb. principalis* L. — *Vidua principalis* Cuv. — *Vidua major et minor* Briss. — *Vidua erythrorhynchos* Sws. — Pl. 8. 2. — Vieill. Ois. chant. t. 28. — Sws. Birds W. Afr. I. t. 12. — Hartl. Beitr. z. Orn. W. Afr. p. 46. — Id. Synops. sp. 328. — Bonap. Consp. sp. 449.

Beinahe über das ganze innere Afrika verbreitet; Sennaar, Nubien, Kordofan, Senegambien, etc.

785. *Hypochera* (Bp.) *nitens* (Gm.)

*Fring. nitens* Gm. — *Fring. ultramarina* Gm. — *Hypoch. ultramarina* Bonap. — *Philetaerus nitens* Strickl. — *Loxigilla nitens* Less. — Pl. enl. 291. 1 et 2. — Vieill. Ois. chant. t. 21. — Edw. Birds t. 362. 1. — Strickl. Ann. et Mag. n. s. IX. p. 345. — Sws. W. Afr. I. p. 199. — Bonap. Consp. p. 450. — Hartl. Synops. sp. 329.

In Ost-Afrika vom 20. Grad nördl. Breite an südwärts. Am Senegal häufig.

786. *Hypochera aenea* Hartl.

*Hypoch. nitens* Bonap. Consp. p. 450. — Hartl. Synops. sp. 330. Senegambien. Vielleicht in Ost-Afrika an denselben Orten, wie *nitens*.

787. *Hypochera musica* (Vieill.)

*Loxia musica* Vieill. — *Estrelida musica* Gr. — Vieill. Ois. chant. t. 11. — Bonap. Consp. p. 450. — Hartl. Synops. sp. 331.

Anmerk. Hiermit schliesst die umfangreiche Ordnung der *Insessores* Vig. und zugleich für unser Journal, wenigstens voraussichtlich auf längere Zeit, das vorstehende systematische Verzeichniss der Vögel Afrika's, da der durch seine afrikanischen Reisen bekannte Verfasser inzwischen eine neue Reise über Nordamerika nach Westindien und Central-Amerika bereits angetreten hat. Den unermüdlichen Bestrebungen des unternehmenden Reisenden den besten wissenschaftlichen Erfolg wünschend, hoffen wir über die Resultate dieser neuen Reise seiner Zeit in unserem Journale berichten zu können.

Der Herausgeber.