

ANEXO 1. Listado anotado de las especies de aves registradas - Resguardo Indígena Yaigofé-Apaporis, 15 marzo-3 abril del 2009

F. Gary Stiles, Instituto de Ciencias Naturales, Universidad Nacional de Colombia

Familia-Especie	Nombre en español	Hábitat	Ríos Prá- Apaporis	Piedra Ni Bocas del Prá	La Playa	Jiririmo	Jotabeyá	Tipos de Registros	Comentarios
Tinamidae	<i>Tinamus guttatus</i>	Tinamú gorgiblanco	BTF	1	1	1	1	A	Poco común, piso del bosque
	<i>Cypripurillus soui</i>	Tinamú chico	RCH,BS	1	1	1	1	A	Común pero invisible
	<i>C. duidae</i>	Tinamú patigris	BAA	1	1	1	1	A	Identificación tentativa
Ardeidae	<i>Anhinga anhinga</i>	Pato aguja	RIB	1				V	Ind. solitarios, esp. cerca de raudales
	<i>Ardea alba</i>	Garza real	RIB	1				V	Ind. solitarios esparcidos, esp. cerca de raudales
	<i>A. coccyi</i>	Garza morena	RIB	1				V	2 ind. solitarios, bordes del ríos en árboles
	<i>Butorides striatus</i>	Garcilla rayada	RIB	1				V	Ind. solitarios, esp. cerca de raudales
	<i>Egretta caerulea</i>	Garca azulada	RIB	1				V	Ind. solitarios, esp. cerca de raudales
Threskiornithidae		Ibises							
	<i>Mesembrymbis caymenensis</i>	Ibis verde	BG, BP	1	1	1	1	VA	Gen. en parejas o grupos de hasta 4-5; ruidoso
Carthartidae	<i>Sarcorampbus papa</i>	Rey zamuro, rey de gallinazos	AE	1	1	1	1	V	Ind. solitarios volando alto
	<i>Cathartes melanobrotus</i>	Guala amazónica	AE	1	1	1	1	V	Ind. solitarios, ocas. hasta 2-3 planeando
Accipitridae	<i>Ictinia plumbea</i>	Elamio plomizo	BB	1	1	1	1	V	Ind. solitarios o parejas en vuelo o perchas altas
	<i>I. mississippiensis*</i>	Elamio viajero	AE	1	1	1	1	V	Bandadas migratorias en varios días
	<i>Elanoides forficatus</i>	Elamio tijera	AE	1	1	1	1	V	Sobrevolando, intento cazar un colibrí en una rama alta
	<i>Lepidom ceymenensis</i>	Elamio cabecegis	BB	1	1	1	1	VA	Llegó a un árbol alto, grrito
	<i>Buteogallus urubitinga</i>	Cangrejero mayor	BG	1	1	1	1	V	Posado alto mirando el río
	<i>Buteo magnirostris</i>	Gavilán campestre	BB,RCH	1	1	1	1	V	Común cerca de comunidades
	<i>B. platypterus*</i>	Gavilán aludó	RCH	1	1	1	1	R	Cayó en red, rastrojó al borde de chagra
Pandionidae	<i>Pandion haliaetus*</i>	Águila pescadora	RIB,AE	1				V	Ind. solitarios, esp. cerca de raudales
Falconidae	<i>Microstrur githcolis</i>	Halcón de monte ojiblanco	BTF	1				VA	Cantando al amanecer en bosque alto
	<i>Daphnis ater</i>	Caco negro	BB,AE	1	1	1	1	VA	Parejas bulliciosas, bordes de ríos o comunidades
	<i>Ibycter americanus</i>	Caco avispero	BTF,BB	1	1	1	1	VA	Grupos muy ruidosos en dosel del bosque alto
	<i>Falco rufigularis</i>	Halcón murcielaguero	BG	1				V	Inds. y parejas e perchas altas con vista a los ríos
Cracidae	<i>Oryzopsis guttata</i>	Guacharaca moteada	BS,BB	1	1	1	1	A	Coros ruidosos escuchados esporádicamente
	<i>Aramidés cajama</i>	Chilaca colihiega	BG	1	1	1	1	A	Un coro escuchado en rebalse del Río Apaporis
Scolopacidae	<i>Actitis macularia*</i>	Andarrios maculado	RIB,COM	1	1	1	1	V	Además de ríos, uno vivió en la comunidad de Jotabeyá
	Laridae	Gaviotas y charranes							
	<i>Phaetusa simplex</i>	Charrán picudo	RIB	1	1	1	1	V	1-2 volando sobre los ríos
	<i>Sterna superciliosa</i>	Charrán fluvial	RIB	1				V	Bandada de ca. 40, islote del Raudal Jotabeyá
Columbidae	<i>Patagioenas spectosa</i>	Paloma escamada	BB,SA	1	1	1	1	VA	Preferir árboles altos en zonas abiertas y bordes
	<i>F. plumbea</i>	Paloma plomiza	BTF	1	1	1	1	VA	Cantando en el dosel; común
	<i>F. subvinnacea</i>	Paloma colorada	BTF	1	1	1	1	A	Cantando en el dosel; poco común, sólo en Jiririmo
	<i>Leporilla rufaxilla</i>	Camimera frentiblanca	BS	1	1	1	1	VA	Cantando desde vegetación densa, sobobosque alto
	<i>Geopygion montana</i>	Paloma-perdiz rojiza						VAR	Dos nidios con pichonesen sobobosque bajo

Registros en:

Psittacidae		Loros, pericos y guacamayas										
<i>Ara macao</i>	Guacamaya bandera	BTF, BB, AE	1	1	1	1	1	1	1	VA	Generalmente parejas; volando alto o en árboles altos	
<i>Orthopsittaca manilata</i>	Guacamaya de morichal	AE	1							V	Una pareja sobrevoló el río Pirá	
<i>Brotogeris cyanoptera</i>	Periquito aliazul	BB	1							VA	Una bandada sobrevoló el río Pirá cerca de San Luis	
<i>Pyrrhura melanura</i>	Perico colirrojo	SA, BTF							1	VRC	Uno capturado en sabana volando bajo	
<i>Pionus menstruus</i>	Cotorra cabeciazul	BB, RCH, AE	1	1	1	1	1	1	1	V	Ind. solitarios hasta grupos de 3-4 frecuentes	
<i>Pyrrhura barrabandi</i>	Cotorra cabecinegra	AE					1			V	Una pareja sobrevoló una chagra en La Playa	
<i>Pionites melanocephalus</i>	Cotorra pechiblanco	BTF, AE	1						1	V	Parejas sobrevolando ríos y el Quebradón Jotabeyá	
<i>Amazona farinosa</i>	Loro real	BTF, AE	1		1	1	1	1	1	VA	Grupos de hasta 15 en el dosel o sobrevolando	
<i>A. amazonica</i>	Loro cariamarillo	AE	1						1	VA	Como el anterior pero menos común	
<i>A. festiva</i>	Loro rabirrojo	AE	1		1					VA	Parejas sobrevolando en dos ocasiones	
<i>Derophtus accipitrinus</i>	Loro gavilán	BB							1	VA	Una pareja volando entre árboles altos	
Cuculidae		Cuculillos, garrapateros										
<i>Piaya cayana</i>	Cuco ardilla	BB			1				1	VA	Su canto distintivo casi nunca se escuchó	
<i>Crotophaga ani</i>	Garrapatero común	RCH		1	1	1	1	1	1	VA	Común alrededor de todas las comunidades	
Strigidae		Búhos y lechuzas										
<i>Megascops choliba</i>	Lechucita común	BS, BB			1	1	1	1	1	VA	Cantando de noche exc. en Jotabeyá	
<i>M. watsonii</i>	Lechucita selvático	BTF						1	1	A	Cantando antes del amanecer en bosque alto	
<i>Pulsatrix perspicillata</i>	Búho de anteojos	BB				1				A	Cantando antes del amanecer, borde de bosque alto	
Nyctibiidae		Bienparados										
<i>Nyctibius griseus</i>	Bienparado común	BB			1				1	A	Cantando de noche, esp. en Jirijirimo	
Caprimulgidae		Gallinaciegas, chotacabras										
<i>Chordeiles minor*</i>	Añapero migratorio	AE	1						1	V	Grupos migratorios volando alto al anochecer	
<i>Nyctiprogne leucopyga</i>	Añapero ribereño	BG, AE	1	1					1	VA	Parejas sobrevolando ríos al anochecer	
<i>Nyctidoromus albicollis</i>	Guardacaminos común	BB, RCH			1	1	1	1	1	VA	Cantando esporádicamente alrededor de comunidades	
<i>Caprimulgus nigrescens</i>	Chotacabras negruzco	SA							1	VC	Descansando de día en sabana	
Apodidae		Vencejos										
<i>Streptoprocne zonaris</i>	Vencejo Collarejo	AE							1	1	V	Una bandada grande en Jirijirimo
<i>Chaetura cinereiventris</i>	Vencejo ceniciento	AE	1	1	1	1	1	1	1	V	Muy común; grupos de hasta 30	
<i>C. egregia (?)</i>	Vencejo amazónico	AE					1	?	?	V	Volando con el anterior; ident. tentativa	
<i>C. brachyura</i>	Vencejo colicorto	AE					1			V	2-3 volando alto	
<i>Tachornis squamata</i>	Vencejo de morichal	AE, BP	1	1	1	1	1		1	V	Cerca de canaguchales	
Trochilidae		Colibríes										
<i>Threnetes leucurus</i>	Ermitaño coliblanco	BB, RCH				1			1	VRC	Común Jirijirimo, visitando <i>Costus</i>	
<i>Phaethornis malaris</i>	Ermitaño piquicurvo	BTF, BB, BS		1	1	1	1	1	1	VRC	No abundante pero por todas partes; sotobosque	
<i>P. bourcierii</i>	Ermitaño picudo	BS, BTF, BB			1	1	1	1	1	VRC	Poco común, sotobosque	
<i>P. ruber</i>	Ermitaño rojizo	BS, BB			1	1	1	1	1	VRC	Común Jirijirimo, menos en otros sitios	
<i>Florisuga mellivora</i>	Jacobino nuquiblanco	BB, BS		1	1	1	1	1	1	VR	Visitando flores de <i>Inga</i> , bordes de comunidades	
<i>Anthracothonax nigricollis</i>	Mango pechinegro	RCH		1						V	Visitando flores de <i>Palicourea</i> , borde del aeropuerto	
<i>Heliophryx aurita</i>	Hadita oriental	BB				1			1	VC	Visitando flores de <i>Inga</i> , bordes de comunidades	
<i>Discosura langsdorffi</i>	Cola de lira tronador	BB							1	VR	Visitando flores de <i>Inga</i> , bordes de comunidades	
<i>Heliodoxa aurescens</i>	Brillante pechirrojo	BB				1				V	Cazando insectos, encima de borde de chagra	
<i>Campylopterus largipennis</i>	Ala de sable gris	BB							1	1	V	Visitando flores de <i>Inga</i> , bordes de comunidades
<i>Chrysuronia oenone</i>	Zafirlí colidorado	BB			1	1	1	1	1	VRC	Visitando flores de <i>Inga</i> , bordes de comunidades	
<i>Hylocharis cyanus</i>	Zafiro barbiblanco	BB							1	VRC	Visitando flores de <i>Inga</i> , bordes de comunidades	
<i>Thalurania furcata</i>	Ninfa morada	BTF, BB, BS		1	1	1	1	1	1	VRC	Visitando flores de <i>Inga</i> , también en sotobosque	
Trogonidae		Quetzales y trogones										
<i>Pharomachrus pavoninus</i>	Quetzal amazónico	BTF							1	A	Escuchado en bosque alto cerca de quebrada	
<i>Trogon viridis</i>	Trogón coliblanco	BTF, BB	1		1	1	1	1	1	VA	Común, cantando del dosel	
<i>T. violaceus</i>	Trogón violáceo	BTF							1	1	VA	Mucho en común que <i>T. viridis</i>
Momotidae		Barranqueros										
<i>Momotus momota</i>	Barranquero amazónico	BTF, BG			1	1	1	1	1	VA	Cantando al amanecer cerca de quebradas	

Ind. solitarios, bocas de quebradas	VA		1		1		1		1	RIB	Martín pescador mayor	<i>Megasceryle torquata</i>
Ind. o parejas esparcidas	V		1							RIB	Martín pescador marraquero	<i>Chloroceryle amazona</i>
Más en quebradas; escaso	V		1							RIB	Martín pescador chico	<i>C. americana</i>
Cazan insectos en el dosel	VC		1							BTF	Jacamar negro	<i>Galbula dea</i>
Sotobosque, borde de claro	VRC		1							BTF	Jacamar pío de oro	<i>G. albivestris</i>
										BTF	Pájaros bobos, bucos	Bucconidae
Saliendo a cazar de perchas altas y abiertas	VA		1	1	1	1	1	1	1	BG, BB, BTF	Bobo mirasol	<i>Chelidoptera tenebrosa</i>
Grupos en dosel, a veces con bandadas	VA		1							BTF	Monjita carblanca	Captonidae
										BTF	Barbudos	
Cantando desde el dosel	VA		1	1	1	1	1	1	1	BTF	Barbudo dorado	<i>Capito auratus</i>
											Tucanes	Ramphastidae
Poco común; dosel y bordes	V		1							BTF, BB	Tucanito pío de marfil	<i>Pteroglossus azara</i>
2, bosque borde de sabana	V		1							BTF, BB	Tucanito de dos bandadas	<i>P. plurinctus</i>
Común; cantando del dosel	VA		1	1	1	1	1	1	1	BTF, BB	Tucán silbador	<i>Ramphastos tucanus</i>
Mucho menos común, también del dosel	VA		1	1	1	1	1	1	1	BTF, BB	Tucán pechiblanco	Picidae
											Carpineros	
Uno cruzó el río Pirá	V								1	BTF	Carpinero martillo	<i>Celex elegans</i>
Dosel medio, a menudo con bandadas	VA		1	1	1	1	1	1	1	BTF	Carpinero rabiamartillo	<i>C. grammacus</i>
En árboles de la comunidad	VA		1	1	1	1	1	1	1	COM	Carpinero buchipecoso	<i>Colaptes punctigula</i>
En grupos, árboles muertos aislados	VAC		1	1	1	1	1	1	1	BB, BS, RCH	Carpinero ojoón	<i>Melanerpes cruentatus</i>
Frecuente cerca de comunidades	V		1	1	1	1	1	1	1	BB, RCH	Carpinero real	<i>Dryocopus lineatus</i>
Poco común en general	VA		1	1	1	1	1	1	1	BTF, BS	Carpinero marcial	<i>Campophilus melanoleucos</i>
Generalmente alto en el dosel	VA		1	1	1	1	1	1	1	BTF	Carpinero cuellirrojo	Dendrocolaptidae
											Trepatorncos	
Generalmente con bandadas mixtas	VR		1	1	1	1	1	1	1	BTF	Trepatorncos barbblanco	<i>Dendrococcyx merula</i>
Uno en bosque secundario	VAR		1	1	1	1	1	1	1	BS, BB	Trepatorncos pardos	<i>D. fuliginosa</i>
Con bandada mixta	RC		1	1	1	1	1	1	1	BTF	Trepatorncos oliváceo	<i>Sittaenops griseicapillus</i>
Común en todos los sitios	VRC		1	1	1	1	1	1	1	BTF, BS, BB	Trepatorncos pío de cuña	<i>Glyphorhynchus sphenurus</i>
Regularmente con bandadas mixtas	VR		1	1	1	1	1	1	1	BTF	Trepatorncos barronado	<i>Dendrocolaptes certhia</i>
A veces con bandadas, a veces solo	V		1	1	1	1	1	1	1	BTF	Trepatorncos ocellado	<i>Xiphorhynchus ocellatus</i>
											Hojarqueseros, horneros	Furnariidae
A veces con bandadas, a veces solo	VR		1	1	1	1	1	1	1	BTF, BS, BB	Xenops común	<i>Xenops muninus</i>
Con bandadas mixtas, niveles medios	VRC		1	1	1	1	1	1	1	BTF	Hojarquesero estrado	<i>Hylocistis subulatus</i>
Con bandadas mixtas	VRC		1	1	1	1	1	1	1	BTF	Hojarquesero típico	Thamnophiliidae
											Barata lineado	<i>Cymbilaimus lineatus</i>
Cantando en sotobosque denso cerca de quebrada	VA		1	1	1	1	1	1	1	BTF	Barata ratón	<i>Thamnophilus murinus</i>
											Barata amazónico	<i>T. amazonicus</i>
Cantando en bosque secundario bajo	VR		1	1	1	1	1	1	1	BS, BTF, BB	Barata amazónico	<i>Thamnomaines caesus</i>
Parjetas o grupos con bandadas; ruidoso	VARC		1	1	1	1	1	1	1	BTF	Homíguero cinéreo	<i>T. ardescens</i>
Como el anterior pero menos común, menos ruidoso	VA		1	1	1	1	1	1	1	BTF	Homíguero gris azulado	<i>Mymothecnia chertrei</i>
Parja en matorral de sabana	RC		1	1	1	1	1	1	1	SA	Homíguero de Chertie	<i>M. striolata</i>
Con bandada mixta en bosque	V		1	1	1	1	1	1	1	BTF	Homíguero amazónico	<i>M. menestresi</i>
En parejas, con bandadas mixtas	VC		1	1	1	1	1	1	1	BTF	Homíguero marfil	<i>M. longipennis</i>
En parejas, grupos de hasta 4 con bandadas	VRC		1	1	1	1	1	1	1	BTF	Homíguero allargado	<i>M. obscura</i>
Con bandadas mixtas, borde y bosque	V		1	1	1	1	1	1	1	BTF	Homíguero carblanco	<i>M. axillaris</i>
Con bandadas mixtas en bosque	V		1	1	1	1	1	1	1	BTF	Homíguero flanguliblanco	<i>Epinectophylla haematona</i>
Con una bandada mixta	V		1	1	1	1	1	1	1	BTF	Homíguero loncastaño	<i>Hypocnemis cantator</i>
Capturado en bosque cerca de la sabana	VRC		1	1	1	1	1	1	1	BTF	Homíguero Canoro	<i>H. hypoxanthus</i>
Capturado en sotobosque	VRC		1	1	1	1	1	1	1	BTF	Homíguero cejiamarillo	<i>Dichrozona cincta</i>
Con bandadas mixtas, sotobosque alto	VRC		1	1	1	1	1	1	1	BTF	Homíguero bandado	

<i>Cercomacra tyrannina</i>	Hormiguero negruzco	BS,RCH	1	1	1	1	1	VAR	Muy común en rastrojo alto y chagras viejas
<i>C. cinerascens</i>	Hormiguero nagüiblanco	BTF,BS		1		1	1	VAC	Cantando desde marañas del sotobosque alto
<i>Myrmoborus myotherinus</i>	Hormiguero carinegro	BTF					1	VAR	Capturado en sotobosque cerca de quebrada
<i>Hypocnemoides melanopogon</i>	Hormiguero barbinegro	BS			1			VRC	Capturado en bosque secundario bajo
<i>Percnostola rufifrons</i>	Hormiguero cabecinegro	BTF			1	1	1	VRC	Sotobosque, poco común
<i>Pithys albifrons</i>	Hormiguero penachudo	BTF		1		1	1	VR	Común en sotobosque
<i>Gymnopathys leucaspis</i>	Hormiguero rufalbo	BTF		1		1	1	VAR	Localmente común en sotobosque
<i>Rhegmatorhina cristata</i>	Hormiguero colorado	BTF				1	1	VRC	En parejas en sotobosque
<i>Phlegopsis erythroptera</i>	Hormiguero pavo	BTF				1	1	VRC	En parejas en sotobosque, con <i>Rhegmatorhina</i>
<i>Willisornis poecilonota</i>	Hormiguero dorsiescamado	BTF,BS		1	1	1	1	VARC	Común en sotobosque en general
<i>Hylophylax naevius</i>	Hormiguero dorsimanchado	BTF				1	1	VRC	Sotobosque, generalmente en parejas
Formicariidae	Hormigueros terrestres								
<i>Formicarius colma</i>	Gallito nuquirufo	BTF				1	1	VRC	Capturado o visto cerca del piso del bosque
Grallariidae	Hormigueros zancudos								
<i>Myrmothera campanisona</i>	Myrmothera campanero	BTF		1		1	1	A	Cantando frecuentemente del piso del bosque
Pipridae	Saltarines								
<i>Tyrannetes stolzmannii</i>	Saltarín grillo	BTF		1	1	1	1	VA	Cantando incesantemente, sotobosque alto
<i>Neopelma chrysocephalum</i>	Saltarín zumbador	BTF		1				VA	Un lek a lo largo de un filo en bosque alto
<i>Heterocercus flavivertex</i>	Saltarín collarajo	VAR				1		RC	Capturado en varillal
<i>Dixiphia pipra</i>	Saltarín cabeciblanco	BTF			1	1	1	VR	Poco común en sotobosque
<i>Lepidothrix coronata</i>	Saltarín coroniceleste	BTF,BS		1	1	1	1	VAR	Común pero poco canto; a veces con bandadas
<i>Pipra erythrocephala</i>	Saltarín cabecidorado	BTF,BS	1	1	1	1	1	VR	Un lek activo en Jotabeyá; poco común en otros sitios
<i>Xenopipo atronitens</i>	Saltarín negro	SA				1	1	VRC	Común en la sabana de Jirijirimo
Tityridae	Tityras y cabezones								
<i>Schiffornis turdina</i>	Schiffornis turdino	BTF				1		ARC	Capturado en bosque alto
<i>Piprites chloris</i> (fam. <i>Incertae sedis</i>)	Piprites oliva	BTF				1		V	2-3 con bandada mixta
Cotingidae									
<i>Cotinga cayana</i>	Cotinga real	BTF,BS		1			1	V	En dosel, en árboles con frutos; pareja cruzó Q. Jotabeyá
<i>Cotinga maynana</i>	Cotinga turquesa	BTF						V	Pareja en dosel alto al lado del río Pirá
<i>Xipholena punicea</i>	Cotinga pompadour	BTF, BG	1	1			1	V	En árboles grandes con frutos, o en ramas expuestas
<i>Lipaugus vociferans</i>	Guardabosque gritón	BTF			1		1	VA	Leks con actividad relativamente baja en bosque alto
<i>Querula purpurata</i>	Cuaba	BTF					1	A	Grupo escuchado en dosel del bosque
Tyrannidae	Mosqueros, atrapamoscas								
<i>Zimmerius gracilipes</i>	Tiranuelo amazónico	BTF,BS			1	1	1	V	A veces con bandadas, a veces solo: dosel
<i>Tyrannulus elatus</i>	Tiranuelo coronado	BS,RCH	1	1	1	1	1	VA	Alrededor de comunidades
<i>Mionectes oleagineus</i>	Mosquerito ocráceo	BTF,BS		1	1	1	1	VAR	En sotobosque por todas partes
<i>Elaenia flavogaster</i>	Elaenia copetona	RCH	1	1	1			VA	Alrededor de comunidades, poco común
<i>Poecilotricus latirostre</i>	Espatullilla rubicunda	RCH	1	1	1	1	1	VRC	Común en vegetación baja y densa
<i>Hemitriccus</i> sp.	Picochato sp.	VAR					1	VA	Cantando temprano, no se pudo coleccionar
<i>Lophotriccus galeatus</i>	Tiranuela penachudo	BS,BTF					1	VRC	Vegetación emarañado, esp. cerca de quebradas
<i>Platyrrinchus platyrhynchus</i>	Picopala canelo	BTF					1	RC	Capturado en sotobosque
<i>Tolmomyias sulphurescens</i>	Picoplano azufrado	BS,RCH		1	1			V	Alrededor de comunidades, poco común
<i>T. poliocephalus</i>	Picoplano menor	BTF				1	1	V	Con bandadas mixtas, niveles medios del bosque
<i>Onychorhynchus coronatus</i>	Mosquero real	BTF,BS					1	VRC	Capturado en sotobosque en borde de claro
<i>Myiobius barbatus</i>	Mosquerito barbudo	BTF			1	1	1	V	Con bandadas mixtas, niveles medios del bosque
<i>Neopipo cinnamomea</i>	Mosquerito canelo	BTF					1	RC	Capturado en sotobosque cerca de quebrada
<i>Myiophobus fasciatus</i>	Mosquerito pechirrayado	RCH		1				VRC	Rastrojo cerca de la comunidad
<i>Lathrotriccus euleri</i>	Mosquerito de Euler	SA					1	VRC	Capturado en matorral de sabana; anidando?
<i>Empidonax alnorum</i> *	Mosquerito matorralero	RCH,SA					1	VR	Matorral, rastrojo: ind. solitarios
<i>Contopus virens</i> *	Pibí oriental	RCH,BB	1	1	1	1	1	V	Grupos sueltos - "olas" migratorias
<i>Ochthornis littoralis</i>	Pitajo ribereño	RIB	1				1	V	Parejas esparcidas en los bordes de los ríos
<i>Conopias parva</i>	Suelda diadema	BB		1				V	Posado alto, borde de chagra vieja
<i>Attila spadiceus</i>	Attila lomiamarilla	BTF,BS					1	VA	Cantando al amanecer del dosel
<i>Miarchus ferox</i>	Mosquero garrochero	RCH	1		1			VA	Cerca de comunidades, zonas abiertas

<i>Ramphocelus carbo</i>	Picoplata vinotinto	RCH, BS	1	1	1	1	1	1	VAR	Abundante, en grupos que a veces siguen las bandadas
<i>Tachyphonus surinamus</i>	Parlotero rabiamarillo	BTF, BS, BB			1	1	1	1	VRC	Poco común pero encontrado en muchos sitios
<i>T. cristatus</i>	Parlotero crestado	BB						1	VRC	Visto con bandada en Jotabeyá
<i>Tersina viridis</i>	Tángara golondrina	BS, BB, RCH				1	1	1	V	En bandadas que perchan alto y bajan para comer frutos
<i>Cissopis leveriana</i>	Algodonero	BB						1	V	Uno observado, borde de chagra
Cardinalidae	Picogrueros, cardenales									
<i>Cyanocopsa cyanooides</i>	Picogruoso azulado	BTF					1	1	VRC	En parejas y cantando, sotobosque cerca de quebradas
Emberizidae	Semilleros									
<i>Oryzoborus angolensis</i>	Semillero ventricastaño	RCH			1	1	1	1	VR	Poco común en áreas abiertas
<i>Sporophila castaneiventris</i>	Espiguero ventricastaño	RCH		1	1	1	1	1	VR	Común en chagras y pastizales
<i>Volatinia jacarina</i>	Semillero saltapalito	RCH, SA, COM		1	1	1	1	1	VR	El semillero más común en general
<i>Arremon taciturnus</i>	Pinzón pectoral	BS			1		1	1	VRC	Sotobosque oscuro de bosque secundario denso
<i>Ammodramus aurifrons</i>	Sabanero zumbador	COM		1	1				VR	En áreas abiertas de las comunidades más grandes
Números totales de especies por sitio:			46	40	109	83	141	136		

HABITATS: AE: aéreo-sobrevolando hábitats terrestres; BAA: bosque achaparrado sobre arena blanca; BB: bordes de bosque; BG: bosque de galería; BS: bosque secundario; BTF: bosque alto de tierra firme; COM: alrededor de comunidades, habitaciones humanas, zonas abiertas etc.; RCH: rastrojos y chagras; RIB: hábitats de río- bordes rocosos o barrocos, barras de arena, agua abierta, troncos y ramas saliendo del agua, etc.; SA: sabana sobre arena blanca.

TIPOS DE REGISTROS: V = visual; A = auditivo; R = capturado en redes; C = coleccionado.

OTROS SIMBOLOS: * = migratorio boreal, anida en Norteamérica (muchos en su migración primaveral hacia el norte); ** = migratorio austral, anida en el sur de Sudamérica (muchos en su migración otoñal hacia el norte).